



Dumb Friends League.
SOLUTIONS – VETERINARY HOSPITAL ♥

SPAY/NEUTER DISCHARGE INSTRUCTIONS

The First Night Home

What to Expect After Anesthesia

When your pet leaves the hospital after today's surgery, he may still be a little groggy. It's not unusual for your pet's behavior and ability to protect himself and control his body temperature to be affected.

For your comfort and safety, and that of your pet, we recommend keeping your pet in a warm, quiet room to recover until tomorrow morning.

We also recommend using caution and moving slowly when handling your pet. The remaining sedation can be disorienting, and your pet may bite or scratch without being fully aware of what they're doing.

Post-Operative Feeding Instructions

Mild nausea may be a normal side effect of undergoing surgery with anesthesia. For this reason, it is recommended that you don't offer your pet anything to eat or drink until at least 7 p.m. At that time, you may offer a small amount of water. If there is no vomiting or other signs of nausea (such as excessive drooling, licking of lips, yawning) you may offer your pet a small portion of food (approximately ½ of their normal diet) an hour later.

If there are any signs of nausea or vomiting, remove all food and water until tomorrow morning when your pet may resume their normal diet. Should nausea or vomiting persist beyond the first 24 hours after surgery, please call the hospital.

For animals 6 months and younger, DO offer small amounts of food and water as soon as you arrive home and as often as possible for the next 24 hours.

The Next Two Weeks

Caring for the Incision

The area around the surgical site should be kept clean and dry. Avoid bathing your pet during this recovery period.

A small amount of discomfort or itching around the incision is normal, but it is important that you do not permit any licking or chewing of the incision by your pet or other pets in the household as it can cause serious complications, such as loosening of the suture, swelling and/or opening of the surgical site and infection.

All animals will go home with an Elizabethan collar that should be worn for seven days post-surgery.

We recommend checking the incision site daily to look for any signs of infection or problems that may occur, such as redness, swelling, discharge or bleeding. Please call with any concerns.

Controlling Exercise

To avoid trauma or injury after surgery, keep your pet quiet for two weeks. Do not allow running, jumping, free access to the yard, roughhousing with other animals or children, etc. Take leash walks only during the two weeks of healing.

If it is necessary to lift your pet, we recommend that you place one hand under the chest, using the other hand to support the hindquarters. This method will keep the incision site from being pressured or stretched, which can cause discomfort and injury.

Females in Heat

If your female pet was in heat when she was spayed, the heat scent and behavior may last for several days after surgery. It is essential that she be kept away from the attention of all males, as being bred at this time can cause severe injury.

Vaccinations & Infectious Diseases

Although your pet may have received vaccines today (or within the past two to three weeks), if they were exposed to a contagious disease prior to the vaccine(s), they can still get sick. Please watch for any of the following symptoms: discharge from the eyes or nose, vomiting, diarrhea, sneezing or coughing. If any of these symptoms occur, we strongly urge you to take your pet to your veterinarian immediately. Keep your pet's vaccines up-to-date as recommended to maintain proper immunity!

Problems or Questions?

Please do not hesitate to call us with your questions or concerns. If your pet appears to be in pain, groggy or nauseated for more than 24 hours after surgery, or if you notice any redness, swelling, bleeding or discharge from the incision site, vulva or scrotum.

303.722.5800 • MONDAY-FRIDAY • 7 A.M.–6 P.M.

If you feel your pet needs emergency care after regular hours, please call Animal Critical Care and Emergency Services at 303.239.1200. If you choose to go to this facility, please let the staff know you are a Solutions – Cat Spay/Neuter Clinic patron. Solutions – Cat Spay/Neuter Clinic is not responsible for costs incurred at your regular veterinarian.



Dumb Friends League.
SOLUTIONS-VETERINARY HOSPITAL♥

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS DE ESTERILIZACIÓN

La Primera Noche en Casa

Qué Esperar Después de la Anestesia

Su mascota, que fue esterilizada hoy, puede todavía estar bajo influencia de la anestesia cuando el/ella salga del hospital. Esto puede afectar el comportamiento y la capacidad de su mascota para protegerse y controlar la temperatura de su cuerpo.

Para su comodidad y seguridad, y la de su mascota, recomendamos mantener a su mascota en un cuarto templado y tranquilo, hasta mañana por la mañana, para que tenga oportunidad de recuperarse.

También recomendamos tener cuidado y moverse lentamente cuando este tocando a su mascota, porque la anestesia puede desorientar a su animal, y el/ella puede morder o rasguñar sin estar completamente enterado de lo que está haciendo.

Limite Agua y Comida la Primera Noche

Un poco de náusea puede ser un efecto secundario normal después de la cirugía y anestesia. Por esta razón, se recomienda que usted no le ofrezca nada de comer o beber a su mascota hasta por lo menos las 7 P.M. A partir de esa hora, Ud. puede ofrecerle un poco de agua. Si su mascota no vomita o demuestra otras señales de náusea (baba excesiva, lamer sus labios o bostezar) usted puede ofrecerle una pequeña ración de alimento (aproximadamente 1/2 de su dieta normal) una hora más tarde.

Si hay señales de náusea o vomito, retire todo el alimento y agua y espere hasta mañana por la mañana para regresar a su mascota a su dieta normal.

Si la náusea o el vomito persisten durante más de las primeras 24 horas después de la cirugía, por favor llame al hospital.

Si su animal tiene 6 meses de edad o menos, **DELE** una pequeña cantidad de comida y agua en cuanto lleguen a casa. Siga ofreciendo pequeñas porciones lo más frecuentemente posible durante las próximas 24 horas.

Durante las Proximas Dos Semanas

Cuidados de la Herida

Mantenga el área alrededor de la herida limpia y seca. Evite bañar a su mascota durante el período de recuperación.

Es normal que su mascota tenga poco de molestia o comezón alrededor de la herida, pero es importante que Ud. no permita que su mascota lama o muerda la incisión, ya que puede causar serias complicaciones como pérdida de las suturas, hinchazón y/o apertura de la herida e infección.

Todos animales regresaran a casa con un collar Isabelino que deben usar durante 7 días después de la cirugía.

Recomendamos revisar la herida diariamente, para ver si hay señales de infección u otros problemas que puedan suceder, como enrojecimiento, hinchazón, sangrado o flujo. Por favor llámenos si tiene alguna preocupación.

Controle el Ejercicio

Para evitar trauma o lastimaduras después de la cirugía, mantenga a su mascota quieta por dos (2) semanas. No permita que corra, brinque, acceso libre del patio, juegos bruscos con otras mascotas o niños, etc. Caminar solo con una correa durante las dos (2) semanas de recuperación.

Si es necesario levantar/cargar a su mascota, es recomendable que Ud. lo haga colocando una mano bajo el pecho de su mascota y use la otra para sostener la parte trasera. Esto evitará presionar o estirar el área de la herida.

Para Hembras en Celos

Si su mascota estaba en celo cuando fue esterilizada, el olor de celo y las conductas pueden persistir durante algunos días después de la cirugía. Es absolutamente necesario mantener a su hembra fuera del alcance de todos los perros/gatos machos, ya que el ser cruzada durante este tiempo puede causar heridas muy severas.

Mascotas nuevas adoptadas del refugio

Es importante entender que aunque su nueva mascota ya puede haber sido vacunado, si el/ella fue expuesta a alguna enfermedad en el refugio, todavía puede enfermarse. Por favor este pendiente de los siguientes síntomas: descarga de los ojos/nariz, vomito, diarrea, tos o estornudos. Si cualquiera de estos síntomas se presentan, fuertemente sugerimos que lleve a su mascota al su veterinario inmediatamente.

Problemas o Preguntas?

Por favor no dude de llamarnos con cualquier pregunta o +preocupacion especialmente si su mascota parece tener dolor, esta somnolienta o tiene náusea durante más de 24 horas después de la cirugía, o si nota enrojecimiento, hinchazón, sangrado a flujo de la incisión, la vulva, o el escroto por favor llámenos de inmediato al.

303.722.5800 • LUNES-VIERNES • 7 A.M. – 6 P.M.

Si la mascota necesita atención médica de emergencia después del horario de atención de la clínica, por favor llame al Animal Critical Care and Emergency Services a 303.239.1200. Si decide ir al este hospital, por favor avise al personal que usted es un cliente de Dumb Friends League Solutions – Cat Spay/Neuter Clinic. Dumb Friends League no será responsable por los gastos incurridos con su veterinario privado.